

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷四百一

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官修撰臣吳錫齡

謄錄監生臣陳觀龍

欽定四庫全書

普濟方卷四百

明周王朱橚撰

嬰兒雜證門

雜病

附論

夫小兒百病者由將養乖節或犯寒溫乳哺失時乍飢乍飽致令血氣不理腸胃不調或發成驚欲成伏熱小兒氣血脆弱病易動變證候百端若見甚微證不即治之使成衆病故謂之百病也治之若晚其病則成凡諸

病至於困者汗出如珠著身不流者死見病兒胃陷者其口唇乾目皮反口中氣出冷足與頭相柱卧不舉手足四肢垂而卧正直如縛脚中掌中冷至十日必死不可治也

方

虎睛丸

出聖惠方

治小兒百病療寒熱鬼氣癥癖羸瘦諸痢

驚癇腹脹喘促痰結胸中滿悶

虎睛

一對微炒

牛黃

一分細研

真珠末

一分

犀牛角屑

半兩

巴霜

杏仁一分湯浸去皮尖 吳藍半兩 赤芍藥半兩 牽牛

子半兩 桔梗一分去蘆頭 漢防已一分 牡蠣半兩燒為粉 鱉甲

半兩塗醋炙
令黃去裙襴

右搗羅為末都研勻爛蜜和搗三五百杵丸如菉豆大每服以溫水下二九量兒大小加減服之

龍膽散出聖惠方 治小兒百病療癰蒸客忤驚癇壯熱不解

龍膽一分去蘆頭 鉤藤二分 柴胡一分去苗 黃芩一分 桔梗一分去蘆

頭 赤芍藥一分 茯苓一分 甘草一分炙 蜨蛭二枚去翅足微炒炙

川大黃

一兩對
碎微炒

人參

一分去
蘆頭

當歸

一分炒
微黃

右搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去

滓分為二服日三四服量兒大小加減

牛黃丸

出聖
惠方

治小兒百病驚癇魘魘三十六種無辜癰

子疳濕閃癖天行急黃赤眼等惡主之

牛黃 麝香

各半兩
細研

光明沙

一兩細研
水飛過

真珠末

一分

甘遂

一分煨
令微黃

虎睛

二枚
細研

赤芍藥

赤茯苓

一分
巴豆

霜杏仁

一兩湯浸去皮尖
雙仁麤炒微黃

牡蠣

一分燒
為粉

右搗羅為末都研令勻煉蜜和搗三五百杵尋中兒
如粟米大一二歲如麻子仁大三四歲如麻子大五
歲已上如菜豆大每服平旦以粥飲下二九至午食
時不吐利便更服一九仍與少許湯飲投之當下諸
惡物効

牛黃丸

出聖惠方

治小兒百病及一切難治之疾

牛黃

一分細研

大戟

一分細研

硃砂

麝香

各一分細研

當歸

半兩微炒

枳殼

一分麩炒微黃去穰

鱉甲

半兩塗醋炙令黃去裙襴

巴豆霜

半兩

川大

黃

半兩到
碎炒黃

右搗羅為末都研令勻煉蜜和搗二三百杵丸如黃
米大每服以粥飲下三九量兒大小加減服之

銀白散

醫方
集成

治小兒百病

升麻 知母 甘草 白扁豆 山藥 人參

茯苓

去皮
白朮
各等分

右為細末每服一錢 慢驚搐搦麝香少許飯飲調
下 急驚定後陳米飲調下 驚吐不止丁香湯下

天柱倒脚軟濃米湯調下 夾驚傷寒薄荷葱白
湯調下 疳氣吐脹氣急多渴百合湯下 渾身壯
熱面赤驚叫金銀薄荷湯調下 赤白痢不思乳食
薑三片棗三枚煎湯下 喫食不知飢飽不長肌肉
炒麥芽一撮生薑煎湯調下 暴瀉紫蘇木瓜湯飲
下 神形脫言語不正及大人吐瀉藿香湯下 諸
病後無精神少氣力不思食煎生薑棗湯下 稟受
氣怯可每日一服最妙常服沸湯點不拘時一方無

知母

大効雙九

出聖惠方

治小兒百病身熱頭痛飲食不消心腹

脹滿或心腹痛大小便不利或重下數起或別無
異疾唯飲食過度不知自止哺乳食積或驚寒熱或
蒸後哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉
宜服

甘遂

半兩煨微黃

巴豆霜

半兩

麥門冬

半兩去心焙

牡蠣

一分燒為

粉
麩仁

一分湯浸去皮研入

真珠末

一分

右搗羅為末入研了藥都研令勻蜜和丸半歲兒以
溫水服一雙如菜子大一歲服一雙如半麻子大二
歲三歲服一雙如麻子大常服不拘時鷄鳴時服至
日出當下如不下者以熱粥飲投之即止

加減四君子湯

出活幼口議

理小兒諸疾和胃調心怡神養

氣

人參

去蘆

白茯苓

去皮

白朮

各一兩

甘草

半兩炙

右為細末每服一錢鹽湯點服或哎咀加薑棗尤妙

常服調氣加山藥 和氣加生薑 心神不定加辰砂棗子 心忪心煩心神不寧加茯神 驚啼手足癱瘓睡卧不安加全蝎鉤藤白附子 脾虛胃弱生風多困加半夏麴沒石子冬瓜仁 傷風身熱頭痛氣促加川芎防風等分細辛羌活減半 發渴加乾葛木瓜枇杷葉去毛煩渴加黃耆 胃冷嘔吐涎沫加丁香 嘔逆加藿香葉 脾胃不和加白朮薑棗 脾困加人參木香縮砂仁 脾弱腹脹不思飲食加

扁豆粟米 傷食加炒神麴 胃滿喘急加白豆蔻
涎嗽加杏仁桑白皮半夏麴 風壅邪熱加生薑
荊芥 咳嗽紫蘇湯調胃虛汗出大麥煎湯調飲食
不進加薑棗 經絡蘊熱頭面及身體生瘡加瓜蒌
桔梗傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和加細辛瓜
蒌根桔梗生薑薄荷煎加防風川芎尤良 有寒及
遇天寒發熱去瓜蒌根桔梗 瘡疹已出未出大便
閉澀發渴加瓜蒌根桔梗若不渴臟寒下痢加乾薑

勞熱往來加川芎 盜汗加陳浮麥 虛汗多夜

啼喘加犀角麥門冬 小便赤澀加麥門冬 大便

閉去白朮加陳皮 溫中和氣止吐瀉思飲食俱加

陳皮薑棗若要生胃氣即加白扁豆陳皮薑棗煎

吐瀉腹痛煩渴加黃耆白扁豆藿香乾葛薑棗 吐

逆四肢厥逆腦門低陷加藿香丁香吐利過多脾胃

虛乏欲生風候加白附子生薑 泄瀉加陳皮厚朴

薑棗 作痢加炒罌粟 赤痢加赤芍藥當歸粟米

白痢加炮薑粟米 臟腑滑泄加煨訶子肉 一

方名四聖湯治二十一證 治久吐胃寒加石蓮子

木香黃芪名生胃散 治嘔逆噦噦不止加白扁豆

薏苡仁並炒藿香名銀白散 治胸膈煩悶冷熱不

調痰涎咳嗽不美飲食日夜壯熱加知母貝母烏梅

乾薑名寬中散 治肚腹疼痛加陳皮青皮棗子生

薑名溫中散 治夜啼煩躁肚腹疼痛加沉香硃砂

名鎮心驅邪散 治表裏虛弱時氣作熱欲傳疹候

加細辛瓜蒌名惺惺散 治脾寒胃熱陰陽不順冷
熱常作加滑石地骨皮名六神散 治霍亂吐利神
不安穩加藿香丁香名藿香散 治脾胃虛弱飲食
不進加製厚朴陳皮等分名平胃散 治吐食不納
穀氣加丁香半夏麴名益神散 治脾胃久虛不納
飲食頻吐或瀉不止加肉豆蔻青皮天台烏藥名理
中散 治熱瀉水穀不分加瞿麥車前子名導赤散
治虛熱煩躁定神安志加犀角川芎名安神散

治心氣不足神情恍惚加石菖蒲石蓮子肉石膏

名補心散

治體熱夜啼煩躁加白附子全蝎膩粉

名清神散

治脾虛肌瘦神困面無顏色食不克化

腸胃久寒吐逆無時加黑附子枳殼吳茱萸麥蘖細

辛名溫脾散

治霍亂吐瀉嘔逆腸鳴自利腹肚疼

痛加川白薑名人參散

治傷寒身熱頭痛煩渴加

麻黃乾葛天麻硃砂名解肌散

治心神不寧驚悸

煩赤瘰癧加硃砂羌活防風天麻名鎮心散 治脾

胃虛弱腹肚泄利調中進食加訶子陳皮名益黃散

治虛積利腹肚痛裏急頻併加陳皮罌粟殼名調

中散

治小兒百病及一切難治之疾

出聖惠方

夜明沙

半兩細研

甘草

一分炙微赤剉

芫花

一分醋拌炒令乾

巴豆

十枚

去皮心研紙裏壓去油

右為末都研令勻煉蜜和丸如麻子大每服以溫水下二九量兒大小加減

加減四味飲子

出聖惠方

治小兒百病

當歸

孩子體骨多熱多驚則倍其分數用之

川大黃

先蒸二炊飯久薄切倍乾或兒

小便多熱倍用

赤芍藥

細剉炒兒四肢多熱多驚大便多瀉青黃色宜倍用

甘草

兒熱

即生用兒寒多泄多即炙倍用之

右等分各細剉和勻每服一分以水一鍾煎至五分去滓溫服半合日三四服量兒大小以意加減

醒睡散

出危氏方

治小兒諸病後多睡

白僵蠶

二錢

威靈仙

三錢

大戟

一錢

右為末每服半錢臘茶清調二服便醒

畫眉膏

出危氏方

治斷乳

梔子

三枚燒灰存性研

雄黃

硃砂

少許

右為末入清油少許輕粉少許調勻候兒睡着濃沫於兩眉睡來自不喫乳未効再用即驗

治小兒不能乳

出千金方

用雀糞四枚為末著乳頭飲兒兒大十枚

治小兒食不知饑飽

出千金方

用鼠屎二七枚燒為末服之

失笑散

出全
嬰方

治小兒諸病并汗後不得睡

葇荳子

草烏頭

醋炙切
片麤炒

酸棗仁

炒去皮
各等分

右為末每服半錢水醋各半盞煎至三分服兩服便

睡

治小兒崇病百邪鬼魅癰腫及熱結腫殺疳蟲鼠瘻惡

瘡

以端午日取蝦蟇不拘多少取眉脂以硃砂麝香為

九如麻子小孩子疳瘦者空心一丸如腦疳以妳
調滴鼻中

青金丹 治小兒諸病

青黛

羅過半錢

羊桃

滑石

末

南星

丁香

羅過各二錢七

水

銀

二錢先以錫二錢於銚子內煮鎔便放水銀拌和瀉出放冷用

輕粉

二錢

川巴豆

去皮心膜七十二枚無缺損者并花水浸一宿懸當風處吹乾爛研

右同拌合用軟飯為丸如梧桐子大巴豆不去油依
形證用湯使傷寒後取積痰煎葱湯吞下取疳蟲用

牛肉汁下驚風肚中緊硬面青黑金銀薄荷葱湯吞
下因傷食肚中及腹皮上微熱肚脹夜間作熱似疳
又不似疳面青黃色眼微黃此腹中有積用皂角子
二七粒灰內煨過用水一盞煎至半盞下有積作瀉
魚鮓湯下氣積炒茴香湯下週歲十四九三歲十八
九七歲二十四九看大小加減仍須四更初下此藥
天明通下積盡可依形證候下藥補之臨喫此藥恐
先吐小涎亦不妨

人參羌活散

出德生堂

治小兒感冒諸疾

麻黃

去節五錢冬用七錢半

人參

半兩

川芎

半兩

前胡

二錢半

獨活

錢半羌活

兩半

右咬咀每服一錢水一盞生薑一片薄荷一葉煎至三分去滓服三歲之下一歲之上服一服

木香散

出德生堂

能和表裏通行津液

官桂 木香 大腹子 前胡 甘草 陳皮

丁香 人參 訶子肉 半夏 砂仁 赤茯苓

已上各

三錢

右咬咀每服三錢水一盞薑一片煎六分去滓稍熱

服乳前

千歲丹

傳氏活嬰方

飲交妳而致疾者

伏翼

大者三五十箇去肚內糞糟鹽酒炙令赤色去骨

蕪荑炒

右為末用醬及豆豉薑搗為丸如茱萸大茶酒任下

又宜用伏翼酒

洗浴藥

出傳氏活嬰方

治氣浮身腫

退浮消腫憑洗浴腫退風消便散浮凌霄花根并大
蓼蚕沙馬蓼香茹投白茅質汗宜多用蟬退五加皮
可收皂角紫蘇俱剉碎忍冬藤向籬邊求苦參白芷
隨多少清水濃煎入艾頭天晴日暖頻頻浴兒身疾
去可無憂

交泰丸

出衛生
家寶方

治小兒因驚飲食失節致陰陽不和臟

腑生病中滿氣急噎塞不通飲食下咽即成嘔吐服
之立効驗

水銀 生硫黃

各等分

右同研不見水銀為度棗肉為丸如粟米大每服一歲兒七丸溫米飲下

黃耆白朮散

出十便良方

治諸虛不足面色萎黃臍腹痛脹

不思乳食骨肉消瘦喘促氣羸四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱發歇有時或冒風寒悉皆治之

黃耆 官桂 甘草 白芍藥 人參 茯苓

白朮 神麴

各一兩

右為麤末每服一大錢以水一大盞入生薑二片東

一箇煎至七分去滓溫服食前

銀白散

百一選方

治小兒諸疾慢驚搐搦麤香飯飲調下日

進六服急驚定後陳米飲調下驚吐不止陳米飲調

下天桂倒脚軟濃米飲調下夾驚傷寒發搐薄荷葱

白湯調下疳氣脹急多渴百合湯調下發熱面赤渾

身壯熱忽然驚叫金銀薄荷湯下赤白痢不思乳食

生薑三片棗五箇陳米一合煎飲調下喫食不知饑
飽不長肌肉用麥蘖一撮同炒薑湯調下暴瀉紫蘇
木瓜湯調下形神脫改語言不正及大人吐瀉藿香
湯調下二錢海上名方甚妙

白朮

細到以萊豆一
合炒香去豆

黃芪

微炒勿
令焦

人參

乾山藥

白扁豆

微炒黃香勿
焦各一兩

白茯苓

兩半

白附子

文武火
炒微黃

地上去
火毒

天麻

劉如鷄子大麤
炒黃各半兩

白僵蠶

先去灰微
炒勿焦

木

香

濕紙
裹煨

川升麻

水浸過
生用

甘草

劉炙勿令
焦各一兩

真糯

炒
黃藿

香

去土生
用半兩

右為細末患依湯使服常服米飲調下小兒半錢或

一字婦人產後亦可服

麻黃升麻湯

出東垣
蘭室方

治小兒寒熱鬱喘喉鳴兼腹滿鼻

流清涕脉沉急而數

麻黃

一錢
半

草豆蔻

一分
半

升麻

半
分

益智仁

一分
半

厚朴

甘草

一分
半

當歸梢

一分
半

麴末

半
分

吳茱萸

二分

柴胡梢

一分

蘇木

半
錢

紅花

少
許

生黃芩

一分

全蝎

二
箇

右件剉如麻豆大分作二服每服水一盞煎至七分

去滓稍熱服食後忌風寒微有汗則効

補陽湯

出東垣
蘭室方

治二月間一小兒二歲大寒證明堂青

脉額上青黑腦後青絡高起舌上白滑而喘大便微
青耳尖冷目中常常淚下眼多眵淚胃中不利臥而
驚多眼澁無搖則寒

柴胡

三分

升麻

二分

麻黃

三分

吳茱萸

半

地龍

半

蝎梢

炒

生地黄

半錢

當歸身

三分

炙甘草

一分

黃芪

二分

黃栢

一分

橘

皮一分葛根一分連翹一分

右咬咀都作一服水一大盞半煎法如常乳食後熱服服藥之後添喜笑精神出氣和順乳食旺

消痞丸

出東垣蘭室方

快利

黃連

半兩

枳實

二錢

黃芩

三錢

甘草

三錢

人參

三錢

右為細末蒸餅為丸如粟米大每服三十九溫乳下

塌氣丸

出衛生寶鑑

治中滿下虛單腹滿虛損者

陳皮

去白

蘿蔔子

炒各半兩

胡椒

木香

青皮

去白

草豆

寇

去皮各三錢

蝎梢

去毒二錢半

右為細末水糊為丸如梧桐子大米飲下三十九食
後日三服白粥百日重者一年小兒麻子大桑白皮
湯送下十九日三服大人桐子大四十九如陰囊洪
腫水冷次用滄鹽乾薑白麵各三錢水和膏子攤紙
上塗於陰囊上

二聖丸

出鮑氏方

小兒病中足冷為虛寒腹脹足冷肚中氣

鳴足冷水瀉足冷糞青足冷頭熱足冷脉沉微足冷

陳方以為腫病用

石亭脂

硫黃

炒褐色
各一兩

大附子

半兩
炮

右為末飯丸米大一周十九乳汁下空心或急風足

冷者不用

牽牛散

出全
嬰方

治小兒膀胱實熱腹脹小便赤澀水氣流

腫

又治結胃傷寒心腹硬痛

又治疳氣攻腎耳

聾

右以牽牛生為末三歲一錢青橘皮湯調下食前結

胸傷寒白湯調下耳聾陰腫并用猪腰子半箇薄批
糝藥一大錢重重令遍外以少許鹽擦之濕紙裹煨
熟空心喫此藥又治遍身風疹薄荷湯調下大便利
立効白糊丸小豆大三十九箇香湯下治陰疝常服
消核腫

治小兒核食吐方

出本草

用合明草擣絞汁服

療小兒鬼舐方

出本草

以狐屎燒灰和臘月猪油塗

療小兒野鷄下部痒悶方

枳殼

二兩

鬼箭羽

青木香

鬼臼

各二兩

右為末以醞醋和藥青布裹熨之如瘡頭破令拔去根立瘥

療小兒臟腑寒吐疼作啼其證必下青白黑糞為驗宜服此方

先以葱湯洗次用熟艾紙上烘熱以帕子裹熨臍腹

間頻易之痛止服藥大妙如病久體虛天柱骨倒宜
白殭蠶末三歲用半錢薄荷湯服

治小兒吃土

用鴿鵒肉炙食之不過一枚差

楊氏產乳

出本草

凡子不得與桑椹子食令兒小寒

魃病 附論

夫魃病是陰制小兒所有此魃病由婦人懷娠之時有

惡神導其腹中胎妬嫉而制伏他小兒令病也其妊婦不必悉能制魃故時人或有此兒魃之為病喜微微下痢往來寒熱毛髮鬚鬢不悅是其證也

方

龍膽湯

出直指方

治魃病

龍膽草

微炒

鉤藤皮

柴胡

北梗

芍藥

川芎

茯苓

甘草

炙各二錢

大黃

二錢半濕紙裹煨

人參

一錢

右剉散每服二錢井水煎服仍以紅紗袋夜明沙與

兒帶

甘草散

出聖惠方

治小兒中魘面色白赤而復變青者如醉

色故復發作面赤若青黑色繞口不治覺病候晚者死覺之早者所中邪色氣未入臟腑又微引乳者可服如經有熱小便赤澁夜啼

甘草

一分炙微赤剉

龍骨

一分

赤茯苓

一分

牡蠣

一分燒為粉

生乾

地黃

一分

黃芩

一分

當歸

半兩剉微炒

桂心

一分

右為麤散每服一錢以水一小盞入淡竹葉七片煎

至五分去滓入白蜜一錢更煎一兩沸量兒大小以
意分減溫服一方加麥門冬三五粒同煎

大黃散

出聖惠方

治小兒中魃挾實

川大黃

半兩剉碎微炒

赤芍藥

一分

白蘚皮

半兩

甘草

半兩炙微赤剉

黃芩

一分

犀角屑

一分

赤茯苓

一分

右為麤散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量
兒大小輕重加減日三四服

虎骨丹

出醫方妙選

治被魃病

虎頭骨

炙

鬼臼

草龍膽

鬼箭

各一兩

琥珀

白

膠香

各半兩

右為細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒乳香湯下
量兒大小加減服之

魃妳散

出全
嬰方

治小兒飲母魃妳黃瘦

豆蔻

母丁香

宣連

胡黃連

各等分

右為末三歲半錢空心米湯調下

治小兒繼病服藥不効者 繼病母有娠乳兒兒有病

有瘡痢他日亦相繼腹大或瘥或發他人相近亦能相繼北人未識此病

取伯勞毛與妊娠婦帶之立差一方令兒帶之又方用絳紗袋盛夜明沙令兒帶勿令乳母及外人知之

伏翼散

出聖惠方

治小兒生十餘月後母又有娠令兒精神

不爽身體委痺名為魘病

右取伏翼去毛爪腸燒為灰細研以粥飲調下半錢日四五服効若灸令香熟嚼之哺兒亦効

又方

出聖惠方

用冬瓜四兩切扁竹四兩剉以水三升煎作湯放溫以洗浴兒効

又方

出聖惠方

用龍膽半兩去蘆頭以水一盞煎至六分去滓量兒大小漸漸分減服之

龍膽湯

出危氏方

治孕婦被惡祟導其腹中致令兒病其證

下痢寒熱去來毛髮鬚鬣不悅澤及治婦人有兒未

能行時復有孕使兒飲此乳亦作此病

方見雜病類龍膽散

治小兒魃病

出本草

取白馬眼母帶之

白虎病

附論

夫小兒白虎候者按堪輿歷遊年圖有白虎神云太歲在卯即白虎在寅准此推之知其神所在小兒有居處觸犯此神者便能為病其狀一身微熱有時啼喚有時身小冷屈指如數似風癇但手足不癱瘓耳此名白虎

候又有小兒妊娠時其母被惡神道其腹中胎不肯長
及至生下小兒往往多羸弱寒熱去來毛髮擊擊不悅
或謂疳非也乃名被魑候

方

張渙順正集香散

出醫方
妙選

治小兒白虎病

降真香

沉香

檀香

俱研

乳香

安息香

人參

去蘆頭
各一兩 茯神

酸棗仁

各半
兩

右為細末每服一錢水八分一盞入麝香少許煎至

五分去滓溫服留藥滓臥內燒之

香燭丸

出全
嬰方

治小兒白虎癰癤諸風疼痛遊走無定狀

如蟲齧晝靜夜作及一切手足不時作疼巢氏云按堪
輿歷遊年圖有白虎神太歲在卯即白虎在寅也若
准此推之知其神所在小兒有居處觸犯此神者便
能為病聖惠云白虎風者是風寒濕之毒因虛所起
將攝失理受此風邪經絡停滯百氣不行蓄於骨節
之間或在四肢肉色不正其疾晝靜而夜作即徹骨

髓瘦疼其病如虎之齧故名曰白虎風也其狀身微熱有時啼叫有時小冷屈指如數似風癰但手足不癱瘓此藥能治之甚驗

川烏頭

大八角者
三箇生用

全蝎

二十一
箇生用

黑豆

二十一
粒生用

地龍

去土半

兩生用

右為末麝香半字研拌糯米糊丸如麻子大三歲十
九酒送下臨卧服微有汗即瘥

治白虎病

出本
草

鬼臼苗在糞堆中亦云是糞神今時人

掃糞莫置門下令人病此療之法

取鷄子揩病處呪願送著糞堆頭勿反顧不過三度
差白虎是糞神變喫鷄子

治白虎病關東人呼為厯骨風

出本草

置白獅子於病者前自愈此壓伏之義也

尸注附論

夫小兒尸注者是三尸中之一尸注也人無問小大腹
內皆有尸蟲尸蟲為性惡多接引外邪而共為患小兒

血氣衰弱者精神亦羸故尸注因兒為病其狀沉沉嘿嘿不的知病之處或寒或熱涉引歲月遂至於死死又注易旁人故名之為尸注也 人有三尸能為人患無問老幼但精神衰弱血氣不足者率多被害小兒血氣未真精神未全因有尸注之病其狀沉沉嘿嘿不的知病之所苦或寒或熱彌引歲月遂至於死死後注易旁人故名尸注

方

金露丸

出醫方集成

治小兒勞瘵尸蟲作痛面目羸瘦五心

煩熱如其他食積冷氣痛又非其治臨證審之又有心痛欲絕一時無藥可療急用艾炙大拇指中男左

女右

人參

去蘆

官桂

去皮

川椒

去合口者

白茯苓

川烏

炮

菖蒲

大黃

吳茱萸

各半兩

附子

一箇炮

桔梗

去蘆

紫花木

炒各三分

乾薑

炮

柴胡

去蘆各一分

厚朴

去皮薑製二分

猪牙皂角

去皮二分

右為末別研葶藶子半兩巴豆三分去油膜續隨子
半兩同前藥一處麵糊丸如麻子大以意加減空心

下

桃仁散

出聖惠方

治小兒尸注鬼癖心腹疼痛或加寒熱恍惚

形色多般

桃仁

二七枚湯浸去皮尖雙仁麩炒

木香

人參

桂

去粗皮

虎頭

骨

醋炙 檳榔

京三稜

煨 芥子

炒各一分

麝香

研一分

款冬

花

丹砂

研水飛

乾桃柳葉

各半雨

右為散每服半錢七溫水調下更量兒大小加減

保童丸

出聖惠方

治小兒尸注魃繫驚癇魘魘三十六種無

辜天行急黃

牛黃

研

麝香

甘草

炙

真珠末

各一分

赤芍藥

丹

砂

研水飛一作光明沙

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麤炒各半兩

甘遂

炮半兩

巴豆

五枚去皮心膜研紙裹壓去油盡

虎睛

酒浸一雙

赤茯苓

去黑皮用半兩

右為末和勻煉蜜丸如麻子大三四歲每服二丸荆

芥湯下更量兒大小加減

犀角散

出聖惠方

治小兒尸注及中惡諸病

犀角

鎊

升麻

木香

檳榔

劉各半兩

麝香

一錢細研

桑白

皮

劉

大黃

劉炒各半兩

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒二七枚

右為散每服半錢七溫水調下日四五服量兒大小

加減服

雄黃丸

出聖惠方

治小兒尸注病諸蟲魅精氣入腹刺疼黃

瘦

雄黃

研如粉

雌黃

研如粉各一兩

丹砂

研如粉半兩

白頭翁

去苗三分

麝香

研半錢

徐長卿

各三分

羚羊角

鎊炒

大黃

劉炒各一兩一分

右為末以青羊脂煉過和丸如麻子大一二歲兒每服三丸熱水下空心午後服各一更量兒大小加減

雌黃丹

出醫方妙選

治小兒尸注

雌黃

研

雄黃

研

大黃

炮

鬼臼

去毛各一兩

白頭翁

半兩

桃

仁

三十箇浸去皮炒

巴豆

去皮心膜去油十粒

麝香

研一分

右研勻羊脂五兩鎔和諸藥成膏如黍米大每服三粒至五粒荊芥湯冷下量兒大小加減

立効散

出醫方
妙選

治小兒尸注

川大黃

炮

乾桃柳葉

各一兩

梔子

赤芍藥

硃砂

水飛
一兩

麝香

研

雄黃

研各
一錢

右為末拌勻每服一錢用蜜湯調下大小加減

木香散

出聖
惠方

治小兒尸注心腹滿脹疼痛不可忍

木香

鬼箭羽

當歸

剉炒

桔梗

炒

檳榔

剉各
半兩

紫蘇

莖葉

半兩

右粗搗篩每服一錢七水七分生薑二片煎至四分

去滓不拘時溫服量兒大小加減

生犀湯

犀角

鎊取末
二錢

地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛

剉各

一兩甘草
半兩
炒

右為末每服一二錢水煎服

太乙神精丸 治小兒客忤霍亂腹痛脹滿若注惡風

癲狂鬼祟蟲蠱毒妖魅瘟瘡無所不治

丹砂

曾青

雄黃

各研

雌黃

各研

金牙

研二

磁石

半兩

煨醋滓三遍

搗研四兩

右爲末先將丹砂等五味用醞醋浸之唯曾青用好酒銅器中浸以紙密封頭日曝乾經夏急待用亦須五日無日以火煖之其丹砂等五味日數亦然各研如粉以醞醋拌令乾濕得所內土釜中以六一泥固濟令密候泥乾然後安鐵環施脚一尺五寸置釜於環上初取熟炭火兩枝各長四寸置於釜下待三分消盡二分更加熟火兩枝如此三度然後用生炭燒

增之漸多乃至一復時近釜底即便滿其釜下炭經兩度即罷待火盡極冷然後出之其藥精飛化凝著釜上光明皎潔如雪者最佳若飛上不盡更合舉火如前以雄鷄羽掃取多少不定和以棗肉丸如黍米平旦空腹服一九又常以絳囊帶之男左女右小兒繫頭上辟瘴毒惡氣射工小兒患可以苦酒和之塗方寸紙帖兒心腹上亦有已死者冬二日夏一日與藥得下便活若服藥悶亂可取防風湯飲之則定兼治

大風惡癩偏風風癩歷節鬼繫痰瘰小兒驚忤不能
乳哺癰疽痔瘻腹內積冷婦人產死未經宿狂狗所
噬脛腫蟻蟲寸白惡腫邪鬼精妖并去一切惡疾

鬼臼丸

出聖惠方

治小兒尸注勞瘦或時寒熱

鬼臼

去毛半兩

升麻

三分

麝香

細研

芫胡

去苗一兩

右搗羅三味為末入麝香研勻煉蜜和丸如菉豆大
每服十九煖酒下日三服量兒大小加減

立効散

出聖惠方

治小兒尸注邪氣入腹疔痛

雄黃

細研一分

赤芍藥

半兩

梔子仁

十枚

右搗羅二味為末入雄黃研勻每服半錢匕溫水調

下更量兒大小加減

竈煤散

出千金方

治小兒尸注

竈突中煤

三指撮

鹽

少許

右為散一二歲兒每服半錢匕熟水調下空心午後

各一服量兒大小加減一方相和熬熨之

桃仁湯

出聖惠方

治小兒尸注勞瘦或時寒熱

用桃仁一味二十枚湯浸去皮尖雙仁生研以水一
盞煎至五分去滓量兒大小分減與服以吐為効如
不吐即非注也

驚頭散

出聖
惠方

治小兒尸注

用驚頭一枚燒灰細研為散每服半錢匕新汲水調
下治小兒諸疾

治小兒尸注勞瘦或時寒熱

出聖
惠方

右用鷄子一枚打破生吞之已困者內入喉中搖頭

令下即差

中蠱

附論

夫人有聚毒蠱為蠱者隨飲食入腹能變或食人五臟
小兒時有中之者遂心腹刺痛懊悶急者即死緩者涉
歷年月漸至羸困若注易旁人則為蠱注之病

方

雄麝散

出醫方
妙選

專治蠱毒

雄黃

研

麝香

研

殺羊角

屑

赤芍藥

敗鼓皮

炙令
黃各

一兩 馬兜鈴根 薺芩 鬼臼 各半兩
去毛

右為細末拌勻每服半錢煎甘草湯調下食前服

殺羊角湯

出聖惠方

治小兒中蠱毒腹內堅如石面目青黃

小便淋瀝變易無常

殺羊角

屑

藁荷

各一兩

梔子仁

七枚

黃連

去鬚

赤芍藥

各一

分

犀角屑

半兩

牡丹皮

各一分

右麤搗篩每服二錢匕以水一盞煎至六分去滓分

溫二服日三服量兒大小加減

雄黃散

出聖惠方

治小兒飛蠱狀如鬼氣

雄黃

研

麝香

研

犀角

鎔搗為細末各半兩

右同研令勻每服以溫水調下半錢七日四服量兒

大小加減

比聖湯

出聖惠方

治小兒五種蠱毒

用馬兜鈴根一味麤搗篩每服二錢七水一小盞煎至五分去滓空腹頓服當時隨吐蠱出未快吐再服

又方

出聖惠方

用薺芫一兩搗羅為末以粥飲調服下一錢量兒大小加減

又方

出聖惠方

用敗鼓皮一片燒灰細研如粉空心粥飲調服一錢
七須臾病兒呼蠱主姓名其病即愈

神効散

出肘後方

治小兒中蠱毒腹內堅痛面目青黃羸瘦

骨立病變無常及淋露

用桃上寄生二兩搗羅為散每服半錢匕如茶點服

日三

又方

出聖惠方

用麝香一味細研每服一字七空腹溫水調下即吐
出蠱毒未効再服

治小兒中蠱毒欲死

出聖惠方

用甘草半兩生剉麝搗篩水一中盞煎至五分去滓
分溫二服當吐蠱出若預防蠱者宜熱炙甘草煮汁
服之即內消不吐神効

治小兒中蠱下血欲死

出聖惠方

搗青藍汁頻頻服半合

又方

出聖惠方

取生赤雌鷄翅下血服之立効

治小兒患蠱毒痢

出本草

用生地黄汁一升二合二三四服立効

中惡

附論

夫小兒無故卒然腹刺痛悶亂欲絕者中惡也蓋由陰

陽氣血不調神守不强故鬼毒惡氣得以中之凡腹大而滿脉緊大而浮者死緊細而微者生若餘勢久留再療則變為注 夫小兒中惡者是鬼邪之氣卒中於人也無問大小若陰陽順理榮衛調平神氣相守則强邪不能干正若精氣衰弱則鬼神毒惡氣中之其狀先無他病卒然心腸刺痛悶亂欲死是也

方

鬼箭羽湯

出聖惠方

治小兒中惡心腹卒痛

鬼箭羽

半兩

朴硝

細研

真珠末

一分

羚羊角

鎔

桔梗

炒

升

麻

各一兩

黃芩

去黑心

大黃

剉炒

鬼白

各一兩

芍藥

一兩

桃仁

三十枚去雙

仁皮尖麤炒

茈胡

去苗

一兩

右麤搗篩每服一錢匕以水一小盞煎至六分去滓

分溫三服空心午後各一服量兒大小以意加減一

方無鬼白

芍藥湯

出聖惠方

治小兒中惡心腹堅脹痛顏色青黑大便

不通

芍藥

桔梗

炒

黃芩

去黑心

茈胡

去苗

升麻

各一兩

大黃

剉炒

桃仁

七枚去皮尖雙仁炒
一方作桃仁五枚

鬼臼

一箇
炙一兩

麝香

半錢研

杏仁

四十枚浸去皮尖雙仁炒

右麝搗篩入麝香和勻每服一錢以水一小盞煎至

六分去滓分溫二服空心午後一服以利為度量兒

大小加減

辟邪膏

出醫方集成

治中惡卒暴亦宜服此藥立至蘇甦

中毒心腹刺痛悶亂欲死凡腹大而滿診其脉緊細

而微者生緊而浮大者則死急服蘇合香丸再以皂
角末觸鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓不愈進以
辟邪膏無不効者

降真香 白膠香 沉香

各半兩

虎頭骨 鬼臼

去毛

龍膽草 人參 茯苓

各半兩

右為末入雄黃半兩麝香一錢煉蜜丸如鷄頭實大
每服一粒煎乳香湯下又令兒帶及燒卧內尤妙無
不作効亦治客忤一方無鬼臼有甘草

雄黃丸

出聖惠方

治小兒中惡辟邪氣

雄黃

研

真珠

研各一兩

麝香

研半錢

牛黃

如棗大研

巴豆

四十枚去

皮膜心研去油盡

大棗

十四枚蒸熟去皮核研膏

右除棗外同研為末入棗膏和少許蜜入臼中一千杵搗為膏丸如粟米大每服三丸薄荷湯下空心午後各一服量兒大小以意加減

療小兒中惡等病

鹿角 大豆

各等分

右為末相和勻乳汁塗妳上令兒飲之

治小兒中惡暴死

出經驗良方

用葱白納下部糞門及鼻中活一方以菖蒲末着舌底又吹兩鼻兩耳中効

猪蹄散

出聖惠方

治小兒寒熱及惡氣中人

取猪後脚懸蹄燒灰末以乳汁飲一撮立効

治小兒衝熱惡毒煩悶

用生銀水磨服之忌生血

治小兒辟惡氣

用虎頭骨煮湯浴小兒數用之為佳

治小兒寒熱惡氣中人

以濕豉為丸如鷄子大以摩臑上及手心六七遍又
摩心臍上旋旋祝之了破豉凡看有細毛棄道中即
差

半夏丸

出經驗良方

治小兒暴腹滿欲死

用半夏隨多少微火爆搗末酒和為丸如粟米大每

服三五九淡薑湯蜜湯服

治小兒中糊猴噤

出幼幼新書

凡身微熱雙手捉拳按胸前

口撮不開縮肩體身一似活糊猴此候因受胎六箇月日母見人弄糊猴開口吸着其氣生來被風邪相擊致發此候若不速治即死

右取猫兒糞燒煙熏之即解

治小兒生下多被惡氣息衝着成疾方

出鮑氏方

急取麝香一豆顆冷水調搽之嚙之

辟惡方

出本草

以瑩令小兒帶之能辟惡瑩琥珀千年為瑩用與琥

珀同瑩

烏芍切

普濟方卷四百

欽定四庫全書

普濟方卷四百一

明周王朱橚撰

嬰兒雜病門

客忤

附論

少小所以有客忤病是外來氣息忤之一名中人是為客忤也雖是家人或別房異戶雖是乳母及父母或從外還衣服襟履鬼神粗氣暴氣或牛馬氣者為忤也勢作喘息乳氣未足者皆為客忤其乳母遇醉及勞喘後

乳兒最劇能殺兒也不可不慎凡諸乘馬行得馬汗氣臭未盥洗易衣裝便向兒邊及兒卒見馬來及聞馬鳴驚皆令小兒中馬客忤慎護之持重凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮履中亦爾白衣青帶青衣白帶皆令中忤凡非常人及諸物從外來亦能驚小兒治病豫防之法諸有從外來人及有異物入戶當將兒避之勿令見也若不避者燒牛屎令常有煙氣置戶前則善小兒中客為病者無時不有此病也而秋初一切小兒皆病

者豈是小兒一切悉中客邪夫小兒所以春冬少病秋夏多病者秋夏小兒陽氣在外血脉嫩弱秋初夏末晨夕時有暴冷小兒嫩弱其外則易傷暴冷拆其陽則壯熱胃冷則下痢是故夏末秋初小兒多壯熱而下痢也未必皆是中客及魘也慎不可先下之皆先殺毒後下之耳凡中客忤之為病類皆吐下青黃色水穀解離腹痛妖札面色變易其候似癰但眼不上插耳其脉急數者是也宜與龍膽湯下之加人參當歸各等分多少

亦宜蘇合香丸真珠散 小兒中客急視其口中懸癰
左右當有青黑腫脉核如麻豆大或赤或白或青如此
便當用針速刺漬去之亦可爪摘決之并以綿纏釵頭
拭去血也

方

蘇合香丸

出楊氏
寶書

治傳尸鬼注客忤卒驚及治骨蒸殭

帶肺痿氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴
痢瘀血月閉瘰癧丁腫驚癇小兒吐乳大人糊裡等

病

蘇合香油

一兩入安息香膏內和

白朮 丁香 青木香

白檀香

薰陸香

別研

沉香

硃砂

水飛

香附子

二兩

烏犀角

剉屑

安息香

已上各二兩用無灰酒熬膏和蘇合油

華撥

二兩 訶子

龍腦

一兩

麝香

二兩

右為末研勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如菉豆大空心井花水下四五丸老人小兒三丸溫酒化亦得並用早朝用蠟紙裹一九如彈子大絳紗袋

盛當心帶之能辟一切邪祟故治客忤中惡中鬼也
又方研雄黃麝香煎降真香湯下

真珠散

出醫方集成

治客忤驚風鬼注驚邪痰熱心舍不寧

精神不定心常怔忡睡臥驚跳時或咬牙五心煩熱
有汗煎啼面赤舌白呵發煩渴小便赤色或吐痢黃
沫常服辟驚邪順經安神舍

真珠末

分二

海螵蛸

滑石

各一錢

茯苓

人參

白

附子

各二分

甘草

炙半錢

全蝎

五分

犀角

一錢別研

腦子

半錢別入

麝香

半錢
別入

金銀箔

金三片
銀三片

右為末每服半錢煎燈心麥門冬湯入蜜調下日午
臨卧服之

人參湯 治小兒客忤腹滿痛大便不通

人參

龍腦

釣藤

茈胡

去苗

黃芩

去心

桔梗

炒

赤芍藥

茯神

去木

當歸

切焙各半兩

大黃

剉炒二兩

蜣螂

去足

灸二枚

右粗搗篩每服一錢水一盞煎至五分去滓分溫二

服量兒大小加減

雄黃丸

出聖惠方

辟小兒諸般驚叫顫瘕癰初養不便與服乳

母帶辟諸驚忤之氣

雄黃

二兩

虎頭骨

三分微炙

麝香

一分

獼猴頭骨

三分微炙

白龍

腦

一分

大蛇頭

一枚微炙

乳香

一分

降真香

一分末

煎香

一分末

膠香

一兩

鬼臼

一分末毛為末

右都研令細用熟棗肉和丸如彈子大初生兒當先燒一九次用綠絹袋帶一九於身上辟一切驚忤之

氣

麝香丸

出聖惠方

治小兒新生中客忤發熱乳哺不消及中

風反踈口出舌并吐逆面青目戴上視腹滿或癰羸

瘦及三歲不行

麝香 牛黃

各半兩
細研

黃連

一兩
去鬚

特生礬石

半兩
細研

附

子

半兩炮製
去皮臍

雄黃

半兩
細研

丹砂

半兩
水飛過

桂心

半兩

烏

賊魚骨

半兩

巴豆

三十枚去皮
心別研如膏

赤頭蜈蚣

一條
炙焦

右為末都研令勻煉蜜和丸如黍米大兒生一月至

十月日服一九四十日至百日服二九一歲至三歲
以上加減服之以乳汁下米飲亦得

犀角散

出危氏方

治客忤驚啼壯熱

天麻

犀角

麥門冬

鈎藤

各一錢

鐵粉

半錢

朱砂

研一錢

雄黃

半錢

麝香

少許

右為末每服半錢以金銀煎湯調下薄荷湯亦可仍
以母衣覆兒身以厭之即愈

白鮮皮湯

出千金方

治小兒客賊挾實

白鮮皮 大黃 甘草 各一兩 芍藥 茯苓 細辛

桂心

各十八銖

右㕮咀以水二升煮取九合分三服

犀角散

出聖惠方

治小兒客忤驚啼壯熱

犀角

鎊

鉤藤

丹砂

研各一分

牛黃

研半分

麝香

研三大豆許

麥門冬

去心焙一分

右為末每服半錢煎金銀湯調下不計時候

安神丸

出直指方

治客忤驚啼客熱

生犀末 人參 茯苓 菖蒲 硃砂 雄黃

各等

分

右為末研桃仁膏為丸如麻子大每服三九紫蘇湯

下

麝香湯 治小兒客忤卒痛及滿氣常腹痛

半夏

湯浸十遍
生薑汁炙

黃耆

各一兩

甘草

炙

乾薑

炮

桂

去粗皮各

半兩

右粗搗篩一二歲兒每一錢水七分煎至四分去滓

內麝香少許分溫二服不拘時候更量兒大小加減
安神犀角丸 治小兒客忤驚邪鬼魅

犀角

鎔

車前子

白茯苓

去黑皮

人參

各半兩

雄黃

研一

兩

右為末取柳白皮十兩桃仁十兩水二升煎一升去
滓煎成膏和前藥丸如菉豆大每服三九桃柳枝湯
下

白石脂湯 治小兒客忤吐痢

白石脂

一兩

蜀漆

半兩

牡蠣

假一兩

附子

炮製去皮

一分

右剉如麻豆一二歲兒每一錢水七分煎至四分去滓溫服分為二空心一午後一量兒大小加減

伏龍肝膏

出干金方

治小兒卒中客忤驚啼大呌

伏龍肝

研二兩

鷄子

去殼二枚

地龍糞

研一兩

右研勻或乾更入少許水調如膏先用挑柳湯浴兒後將藥塗兒五心及頂門上

母衣髮乳

出干金方

治中客忤

用燒母衣帶三寸併髮合乳汁服之

雄黃散

出聖惠方

治客忤腹痛危急

雄黃

錢一

明乳香

半錢

生麝

一字

右為末每一字刺鷄冠血調灌之一方無乳香

還魂湯 救卒死客忤死

麻黃

三兩去節

杏仁

去皮尖三十箇

甘草

一兩炙

右水八升煮取三升去滓分令咽之通治諸感忤

韭菜根散 治證同前

韭根

一

烏梅

二七箇

吳茱萸

半升炒

右水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者死煮取三升去滓分飲之

龍骨散

治小兒中客忤體熱

白龍骨

一分

牛黃

半分細研

葛根

一分剉

右為散每服以溫水調下半錢日三四服

治小兒客忤病

出千金方

右用豉數合水拌令濕搗熟丸如鷄子大以摩兒顙

上手足心各五六遍畢以摩兒心及臍上下行轉摩之食頃破視其中當有細毛即擲九道中痛即止

三物燒髮散

出千金方

治少小見人來卒不佳腹中作聲者

右用向來者人顙上髮十莖斷兒衣帶少許合燒灰細末和乳飲兒即便安愈

又方

用水二升煮篇蓄冬瓜各四兩取浴之

牛黃乳

出聖惠方

治小兒客忤驚啼

牛黃

一粟猪乳

殺許

右相和漸漸滴兒口中一方竹瀝一字

雀屎丸

出聖惠方

治小兒卒忤軀啼腹堅滿

雀屎

一兩一分

當歸

切焙半兩

右為末煉蜜丸如麻子大五十日兒每服一九以妳汁下空心午後服量兒大小加減

桂參湯

出十便良方

治小兒中客忤吐青白沫及食飲皆出

腹中痛

桂

去粗皮
一兩

人參

一分

右粗搗篩一二百日兒每服半錢七水半盞煎至二分去滓分溫三服兒大以意增之

治卒客忤停屍不能言者

右燒桔梗二兩為末米飲服仍吞麝香如大豆許佳
又方

用細辛桂心等分內口中

治小兒客忤中人吐下黃水

右用水一斗煮錢十四枚以浴之又取水和粉及熟艾各為丸鷄子大摩小兒五心良久擘開毛出差

桂枝湯 治小兒中客忤吐青白沫及飲食皆出腹中痛氣欲絕

右用桂一味去粗皮一兩粗搗篩一二百日兒每服半錢匕以水半盞煎至三分去滓分溫三服空心午後更量兒大小加減或濃煎去滓塗兒五心

麝香飲 治客忤口噤項強欲死

右用麝香少許研細乳汁調塗口中仍以母衣覆其身即愈一方醋調服一方吞麝香大豆許立愈

一物猪通浴湯 治小兒中人忤軀啼面目青腹強者
右猧猪通二升以熱湯灌之適寒溫浴之

治少小中客忤項強欲死

右取衣中白魚十枚為末以傅乳頭上令兒飲之入咽立愈一方二枚著兒母手掩兒臍中兒吐下愈亦以摩兒頂及脊強處一方書中白魚亦可一方治少

小犯客忤發作有時用母月衣覆兒身良一方治卒
中忤剪取驢前膊脾上旋毛大如彈子以乳汁煎之
令毛消藥成著乳頭飲之下喉即愈又方取牛口沫
傅乳頭飲之一方取牛鼻津服之

治少小卒中客忤不知人者

右取熱馬屎一九絞取汁飲兒下咽便愈亦治客忤
而軀啼面青腹強者一方以馬通三升燒令烟絕以
酒一斗煮三沸浴兒名馬通浴湯

治小兒驚悸客忤催生瀝瘍白癰風

右用蛇蛻皮煎汁傳入藥並灸用

治客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胸不即治亦殺人

右用鉛丹一方寸匕蜜二合和服之口噤者折齒灌之一方用墨水和服一錢匕一方治小兒卒中客忤用銅照子鼻燒令赤着少許酒中淬過少與兒服之即愈

治小兒客忤蠱毒

用烏雌鷄糞燒服之又方治小兒驚癇客忤用家桑東行根煖無毒研汁服大驗

治小兒客忤欲狼狽方

抱兒於廁前取屎草燒灰為末水調服少許即愈

伏龍肝方

竈中黃土和醋搗丸如棗子大摩兒頭及五心

客忤夜啼

竈心土

蚯蚓糞

各等分

右研水傅頭上五心

伏龍肝散

治客忤驚啼不止

伏龍肝

硃砂

山藥

麝香

各等分

右為末薄荷湯調服或煉蜜丸如菉豆大燈心湯下
睡驚丸 治小兒客忤驚熱夜啼煩躁搐搦口噤上視
或冷或熱痰涎壅甚

青黛 礞砂

腦子

麝香

山藥

茯苓

甘

草金箔

各等分

右為末煉蜜為丸如皂角子大硃砂為衣薄荷湯臨

眠化下

治客忤驚啼不止

出傳氏
活嬰方

栝子仁 白茯苓

甘草

各等分

右為末每服一錢麝香湯調下

龍齒散

出傳氏
活嬰方

治客忤夜啼驚悸

石膏 人參

龍齒

硃砂

麝香

甘草

各等分

右為末每服一錢金銀薄荷湯點服

當歸飲

出傳氏
活嬰方

治客忤腹內有惡血夜啼如鬼祟腹痛

唇青口紫

當歸

赤芍藥

白朮

甘草

桂皮

等分

右為末每服一字初生兒腹有血惡而成血病者有
效

治客忤軀啼晝夜不止思忤間忽然而啼

出傳氏方

川芎

當歸

等分

右為末乳汁調下

治客忤狂啼腹痛

出傳氏
活嬰方

硃砂

麝香

雄黃

各等
分

右研勻塗乳上令吮之

治小兒客忤驚啼方

竈中黃土

二兩
研

鷄子

一枚
去殼

右件藥相和入少許水調先以桃柳湯浴兒後將此

藥塗五心及頂門上

治小兒客忤吐奶不乳頭面青黃色脉結急浴法

出聖惠方

青銅錢

一百二十文

右水一斗煮取五升適寒溫以浴兒立効

治小兒客忤壯熱浴方

出聖惠方

白芷根苗 苦參

右件藥等分粗搗為散用清漿水煎入鹽少許以浴

了用粉摩佳

治小兒客忤消食及冷氣

本草方

以鉄屑煎汁服之

治小兒客忤

以熊骨煮湯浴之

又方

用墨搗篩和水溫服之

又方

俱出
本草

以殭蠶七枚為末用酒調下量服之

中馬毒

附論

凡人乘馬到人家身有馬汗不暇湯浴則須換衣服不暇換衣服即食頃間歇定方得親近小兒若不如此則小兒中馬毒客忤或初却馬馬氣未歇將鞍轡等物逼近小兒聞馬嘶便驚皆因中馬毒客忤其肚腹痛吐下青黃色水穀解離甚者致大患也

方

治小兒中馬毒汗氣臭忤馬嘶驚忤宜服此方

出聖惠方

右取馬尾於小兒前燒令小兒咽氣及每日燒之差

為度

又方

取馬口角沫塗兒口中効

卒死

附論

夫小兒卒死者是三虛遇賊風病倉卒而死也三虛者
乘年之衰一也逢月之空二也失時之和三也有此三
虛復為賊風所傷便陰氣偏竭於內陽氣阻隔於外胸
間陰陽不通故暴絕如死若臟腑未竭良久而蘇亦有

挾鬼神氣者皆須邪退乃生宜以藥療之也

方

治小兒卒死方

出聖惠方

右取女青末半錢用牛乳汁調服之

又方

同前

取牛糞絞汁內少許口中差

又方

同前

右燒獾猪糞水解取汁服

又方

同前

右以苦參醋煮取汁少許內口中即蘇水煮亦得

又方

出聖惠方

用爛棺木板酒煮取汁服少許効

又方

同前

右煎鹽湯令極鹽以物開口灌之令入腹即活

又方

同前

右以熱湯和灰厚擁身上逡巡即蘇

破棺散

一名半夏丸
朱氏集驗方

治魘死縊死溺死卒死惡死五絕

心頭暖者宜服此方

用生半夏末量大小或一字或半錢吹鼻中一方以
水調塞鼻中一方用皂角末吹鼻中並差一方用雄
黃末桃枝湯灌之愈

治小兒卒死而吐利不知是何病者

出肘
後方

用馬屎一九絞取汁以吞之無濕者水煮取汁

救小兒卒死而吐利不知是何病者

出金
匱方

用狗屎一九絞取汁以灌之無濕者水煮乾者取汁
一方狗齒燒灰服之

治氣閉不通死絕方但尸厥脉動者可治

用菖蒲末納鼻兩孔中吹之又以桂着舌下又剔取
左角髮方寸燒末酒和入喉立愈

卒腹皮青黑

附論

夫小兒因汗腠理則開而為風冷所乘冷搏於血隨肌
肉虛處停之則血氣沉澀不能榮其皮膚而風冷客於

腹皮故青黑也

方

七氣湯

出危氏方

治挾冷作痛面色或白或青四肢冷甚

青皮

陳皮

桔梗

蓬莪朮

煨

辣桂

藿香

益智仁

各一兩

香附子

一兩

半夏

湯洗三分

甘草

炙三分

右剉散每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎三分服

不拘時候

治小兒卒然腹皮青黑若不急治須臾即死

出聖惠方

右用酒和胡粉塗其腹乾再塗又灸臍下上左右去臍各半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各灸三壯

治小兒卒腹皮青黑赤不能喘息及吐利卒死

出聖惠方

右用女青末內口中酒服之亦治大人

又方

出聖惠方

以苦參一兩搗羅為散不計時以醋湯調下半錢更量兒大小加減

又方

出聖惠方

取爛棺木半兩以醋一中盞煎至六分去滓溫服半
合量兒大小加減

又方

出聖
惠方

右取荊子搗入少水絞取汁暖服半合量兒大小以
意加減

五硬五軟

湯氏五硬五軟集歌云仰頭取氣動搖難氣壅疼連胸
膈間脚手心如水樣冷硬頭直頸未能灣 肚大青筋

急不寬

急亦作硬

冷風積氣病難安面青心腹還多硬性命

當時已自拚

五疳

喜怒無常度看人不轉睛眼乾

啼少淚此候實堪驚

此乃肝疳也

搭口搖頭熱呼漿

上膈乾脾間津液竭多睡不堪看

此脾臟疳也

乾熱大腸結啞啼汗似珠便時多泄氣性命在須臾

此肺疳極候

熱極腎肝病瘡瘍發不安便時乾澀痛

體熱四肢寒

此腎疳也

憔悴更喉乾多啼睡不安

皮膚無色澤骨立不堪看

此心疳也

五軟

天柱骨倒軟

無故如何不舉頭都緣項頸軟難收腎乾熱病今雖減
難保他年發不休 懷抱何緣脚手垂四肢無力懶揚
眉若還受食聲音響脾裏風寒漸可醫 喫食如何不
長肌皮寬肉少痛支離莫教瀉痢當時作靈藥難醫命
即危 五歲孩兒不解行脚虛軟弱痛難名若將榮衛
多培植長大應教肉自生 參耆等藥可榮氣亦可服錢氏地黃丸 唏噓舌
軟却無妨陽盛陰虛着意防此證不須先治膈唇青氣
喘命須亡 雖然天柱倒難醫此証原來不在脾患後

也須曾吐瀉本非久病與疳羸 亦有傷寒無汗脉應須

妙藥辨幾微無事卒然成此疾人形不瘦四肢肥 項軟

還知頭似石面紅唇赤臉如緋此病只因肝膽熱致令

筋軟不相隨 肝受熱風天柱倒祛風退熱速為之項軟

更貼強筋藥立見安和請勿疑

全嬰方云高伸承務女三歲七月間淺瀉一醫

治之月餘不効其證大渴不止羸瘦不食手足漸冷召予視之曰氣已將脫急以木附膏四服手足微溫但一時辰內可三十餘次飲水與魚涎散一服立止再木附膏二服并麝沉膏沒石膏六甲丸參朮散等服五日減半愚曰此病虛中有積當以黃土丸瀉三五行再煎藥補之主人曰首因瀉今乃漸退何再瀉也答曰譬之不

去稂莠則禾稼不實不去奸猾則良民不寧主人曰何治也答曰補不足瀉有餘也補者補其久瀉脾虛不足之氣瀉者瀉其久滯腸中有餘之積主人曰此理出何書答曰素問云實瀉虛補此所謂順天之道損有餘補不足蓋醫合陰陽藥合天道主人聽用黃土九瀉五行再前藥相間進五日疾除八分一日忽天柱骨倒主人甚驚愚曰無慮瀉久則傷脾脾引於肝風肝受賊風故頭垂而頸筋軟也所幸者瀉已退遂用金靈散一服生筋散貼項一日如舊後更前藥二服安全

方

小 鹿 茸 丸

出醫方集成

治胎中受熱遍身筋軟

鹿茸

川牛膝

菟蓉

木瓜

杜仲

兔絲子

當歸 熟地黄 天麻 青鹽

各等分

右為末用蜜九鹽湯溫酒化下皆可

羚羊角散

出醫方大成

治面紅唇白腸熱項軟

熟地黄

酒浸

白茯苓

羚羊角

酸棗仁

炒

虎脰骨

酒炙

肉桂

防風

甘草

各等分

右為末溫酒鹽湯化下皆可

貼項方

出醫方妙選

治肝膽停熱致令筋軟用此藥貼項

附子

生去皮臍

南星

各等分

右為末生薑自然汁調攤貼患處次服防風丸并瀉青

九

五加皮散

出仁
存方

治小兒頸軟

用五加皮為末酒浸調塗傳頸上

健骨散

出仁
存方

治小兒久病疳疾體虛不實飲食不進及

諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五軟

用白殭蠶為末三歲兒半錢薄荷酒調下後用生筋

散貼上

生筋散

出鮑氏方

治如前

木鱉子

六箇去殼

草麻子

六十箇去殼

右研細先抱起顱摩頂上令熱津唾調貼之二方全

愈

天柱丸

出仁存方

治風氣頸起軟頭不得正或去前或去後

蛇含石

一大塊煨七次用醋淬七次

川礬金末

少許

右碾細又入鉢內研極細和前藥末入麝香少許和勻

用雪白大米飯丸如龍眼大每服一九荊芥湯化下或

又入生薑汁一二滴或用金銀薄荷湯早晨不拘時
下風熱項軟合用涼肝丸

手拳不展

附論

夫小兒手拳者由在胞之時其母臟腑氣虛為風冷所
乘兒生之後肝氣不足致筋脉攣縮不得伸展故令拳
不展也

方

薏苡仁散

出聖惠方

治小兒手拳不展是肝氣不足內傷風

邪

薏苡仁

三分

當歸

一分剉微炒

秦艽

半兩去苗

防風

半兩去蘆

桂心

一分甘草

半兩炙微赤剉

酸棗仁

半兩微炒

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒大

小分減不計時

羚羊角散

出聖惠方

治小兒手拳不展是風邪滯氣所客令

榮衛不通

羚羊角屑

羌活

五加皮

白鮮皮

桂心

已上

各一分
麻黃 半兩去根節
甘草 半分炙微炒

右為散每服一錢水一鍾煎至八分去滓量兒大小
加減不時溫服

又方

麻黃 半兩去根節
桂心
赤芍藥
羌活
細辛
甘

草 炙微赤剉已上各一分

右為散每服一錢水一鍾煎至五分去滓不計時服
量兒大小加減分增溫服

薏苡丹

出醫方妙選

治手拳不展所受肝氣怯弱致兩脉攣

縮或伸展無力

薏苡仁

一兩湯浸去皮細研

當歸

一兩洗焙乾

秦艽

一兩去苗

防風

一兩

酸棗仁

一兩羌活

一兩

右件搗羅為末蜜和如鷄頭實大每服一粒至二粒麝香荊芥湯化下不拘時候

脚拳不展

附論

夫小兒脚拳者由在胞之時其母臟腑內有冷積為風

邪所乘兒生之後腎氣不足血氣未榮故令脚指拳縮不展也

方

當歸散 治小兒脚不展指拳縮

當歸

劉微炒

麻黃

去根節各半兩

羌活

酸棗仁

炒

人參

去蘆

頭

杜仲

去粗皮微炙劉

桂心

已上各一分

右為散每服一錢水一小盞入生薑少許煎至五分去滓量兒大小乳食前分減服

山茱萸散 治小兒脚拳不展筋急乾細

山茱萸 羌活 薏苡仁 桂心 羚羊角屑

當歸

劉微炒

甘草

炙微赤劉

黑豆

炒熱

白茯苓

防風

去蘆頭已

上各一分

生乾地黄

半兩

麻黃

半兩去根節

右為散每服一錢水一盞煎至五分去滓於乳食前量兒大小分減溫服

生乾地黄丸 治小兒脚指拳縮

生乾地黄

半兩

郁李仁

半兩湯浸去皮尖微炒

牛膝

去苗

防風

去蘆

頭

桂心

海桐皮

羌活

白茯苓

薏苡仁

已上

各一分

右為末煉蜜丸如菉豆大每於乳食前以溫酒下七
丸量兒大小加減

行遲

附論

凡兒生週歲三百六十日膝骨成乃能行近世小兒多
因父母氣血弱故令胎氣不強骨氣軟弱筋脉無力不
能行步又有所受肝氣怯弱致筋脉攣縮兩手伸展無

力又緣稟受腎氣不足者血氣未榮脚指拳縮無力不能伸展此皆不能依常期以致此疾 治法當以錢氏補腎地黄丸再加鹿茸五加皮麝香髓生而骨強自然行矣外甥黃知錄之子還僧三歲不行遂處此方服之有驗

方

羚羊角丸 治小兒五六歲不能行者骨氣虛筋脉弱宜服益肝腎二臟

羚羊角屑

白茯苓

虎脰骨

醋塗炙黃

酸棗仁

炒生

乾地黄

各半兩

黃耆

桂心

防風

去蘆頭

當歸

炒各一錢

右件搗羅為末煉蜜為丸如菉豆大食前以溫酒研破五丸服之漸漸即行也

五加皮散

治小兒三歲不能行者由受氣不足體力

虛怯腰脊脚膝筋骨軟故不能行

用五加皮為末粥引調下用酒少許調每服一錢日

進三次

麝茸丹 治數歲不能行者曾經大効

麝香

別研

茄茸

酥炙黃

生乾地黄

當歸

洗焙

黃耆

剉虎

脛骨

塗醋炙黃

右為末用羊骨髓四兩煮爛和成膏如黍米大每服
十粒磨沉香下食前日三服

虎骨丸 治小兒五六歲不能行者骨氣虛筋脉弱宜

服益肝腎二臟

虎脛骨

酒炙赤

生乾地黄

酸棗仁

酒浸去皮炒香

白茯苓

辣桂 防風 當歸 川芎 牛膝

等分

右為末煉蜜和丸麻子大每服五丸酒吞下或木瓜湯下夫骨者髓之所養小兒氣血不充則髓不滿骨故軟弱不能行抑亦肝腎俱虛得之肝主筋弱而不能束之一方有黃耆無牛膝

海桐皮散 治稟受腎氣不足血氣未榮腳指拳縮無力不能伸展

海桐皮 牡丹皮 當歸 熟地黃 牛膝

各一兩酒

浸焙

山茱萸

補骨脂

各等分

右為末每服一錢水八分葱白二寸煎食前服

生乾地黃丸 治小兒十歲已來血脉不流筋脉緩弱

脚膝無力不能行步

生乾地黃

當歸

劉微炒

防風

去蘆頭

酸棗仁

微炒

赤茯

苓

黃耆

劉

芎藭

羚羊角屑

羌活

甘草

炙微

赤 劉桂心

已上各等分

右為末煉蜜丸如菉豆大食前以溫酒下十九更量

兒大小加減服之

五加皮散

指出直指方

治十二歲不能行者

真五加皮

一分

牛膝

酸木瓜乾

各半分

右為末每服一錢半粥飲調次入好酒兩點再調食

前服二劑

八味丸

出如宜方

治稟氣虛骨弱七八歲不能行立

牡丹皮

茯苓

澤瀉

各三兩

山茱萸

山藥

各四兩

附子

製桂

各二兩

熟地黃

八兩

右為末蜜丸梧子大每服十二三丸至二十五丸溫酒空心日二服服一料自愈功在澤瀉耳

治小兒數歲不能行方

出千金方

用喪家未開戶時盜食以哺之日三便行起

鶴節 附論

夫小兒鶴節者由稟賦不足血氣不榮肌肉瘦脊則骨節背露如鶴之足皆腎虛不生骨髓之故夫腎者神精之所舍原氣之所繫若其氣強則骨髓滿溢肌體盛充

若氣不足者臟腑勞傷真氣不守邪氣所侵腎氣虛弱
骨髓枯竭而不榮故令骨痿而羸瘦也治法當補腎宜
服錢氏地黄丸本方加鹿茸醋炙川牛膝各二錢修合
餌服一週三歲以下與十丸三歲以上與十五丸

方

錢氏地黄丸

出錢氏方

治小兒鶴節數歲不能行又治頭顱

不合體瘦露皆由稟受血氣不足則髓不滿骨故軟
弱腎虛故以此藥補之疾自愈

熟乾地黄

錢八

山茱萸 乾山藥

錢各四

澤瀉

錢二

牡丹

皮 白茯苓

錢各三

加鹿茸

炙

牛膝

錢各四

右為末煉蜜丸如麻子大空心溫水送下三歲以下

十九以上倍之

龜背龜胸

附論

夫嬰兒生後一百八十日始骨骼成方能獨坐若強令小兒坐之太早即客風寒吹著兒背及背脊至骨傳入於髓使背高如龜之狀乃曰龜背又乳母乳兒當捏其

宿乳夏常洗乳捏去熱乳若兒感餘熱即傷肺氣胸膈
脹滿令兒胸高如龜乃名龜胸又稟受血氣不足不能
榮於髮故頭髮不生呼為瘡病非也及稟受腎氣不足
者則髓不强骨不堅蓋骨之所絡而為髓髓不足不能
充於齒故不生且心之聲為言若兒稍長合語而遲語
由妊娠時母因有驚怖內動於兒藏邪氣乘於心使心
氣不足舌本無力故語遲也

方

松蘿丹

出危氏方

治龜胸龜背嬰兒生下不能護背客風吹

脊入骨髓致之又或坐太早亦致偃僂背高如龜多
成痼疾 凡兒生至周歲三百六十日膝骨成始能
行近世小兒多因父母氣血虛弱故令胎氣軟弱筋
脉攣縮兩手伸展無力又緣稟受腎氣不足者氣血
未榮脚指拳縮無力不能伸展此皆不依常期並集
經用得効方治之

松花

焙

枳殼

炒

防風

去蘆

獨活

各一兩

麻黃

去根

川大黃

炮

前胡

桂心

各半
兩

右為末蜜丸如黍米大每服十粒粥飲下量兒加減

百合丹

出聖
惠方

治龜胸龜背胸高脹滿其狀如龜此肺經

受熱所致也乳母酒麵無度或夏月熱煩熱乳與兒
得之或乳母多食五辛兒亦成此疾

川大黃

三分
焙

天門冬

去心
焙

杏仁

去皮
尖炒

百合

木通

桑白皮

炒

甜葶藶

紙上
炒

爛石膏

各半
兩

右為末煉蜜丸如菉豆大每服五丸食後卧熱水化

下一方有朴硝無爛石膏名大黃丸三歲已上化二
丸

又方

出聖
惠方

甜葶藶

隔紙炒
令紫色

杏仁

湯浸去皮尖雙
仁麩炒微黃

麻黃

去節
根

川

大黃

剉微炙已
上各半兩

桂心

一分

右羅為末煉蜜丸如菉豆大許不時以溫水研下五
丸量兒大小臨時加減

麻黃丸 治小兒龜胸

麻黃

三分去根節

桂心

獨活

防風

去蘆頭

赤芍藥

川大黃

炒剉

枳殼

去穰麤炒微黃

松花

已上各半兩

右羅為末煉蜜丸如棗豆大每服以粥飲下五九日

三服量兒大小加減

又方

檳榔

半兩

川大黃

半兩剉微炒

桂心

前胡

防風

赤

芍藥

獨活

訶梨勒皮

枳殼

炒微黃去穰

麻黃

去根

節已上

各一兩

右羅為末煉蜜丸如麻子大每服以粥飲下五九日
三服量兒大小加減

治小兒龜背

右龜尿摩背上點背上骨節癢取龜尿之法放龜
於荷葉上候龜頭四顧急用鏡子照之其尿自出

百合丹 治龜胸病

百合一兩 川朴硝半兩

杏仁半兩湯浸
去皮尖

桑根白皮半兩 木

通

半兩

天門冬

半兩
去心

川大黃

半兩

右件搗羅為細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒米飲下量大小加減

龜背散

大黃

三分炒

天門冬

去心焙

百合

杏仁

去皮尖炒

木通

桑白皮

蜜炙

甜葶藶

隔紙炒

朴硝

製枳殼

各等分

右為末蜜丸食後溫湯化下

誤吞諸物

附論

夫小兒多以珠璣釵釵之類為玩弄之具或藏放口中

因驚或啼遂誤吞咽倉卒不得出為害亦大當隨物所
宜以方術治之

方

治誤吞錢在喉中不下

用麩炭研為末以指彈少許入喉中少頃自吐出

治誤吞針

用磁石一塊小彈子大吸鐵緊者入口內吸令針出
或絲繫定送咽喉引出或如棗核大磨令光鑽作孔

絲穿令含亦得

治誤吞鈎繩

凡吞鈎繩猶在手者莫伸引但以珠璫若穿了蓋沒子之類就其繩穿稍稍推去至鈎畔即急推前入纔鈎離刺處復緩緩引出

治誤吞珠璫方

燒銅弩牙令赤淬水一碗旋引其物即出

治誤吞銀鐸及釵方

以飴糖隨兒大小多少食之若能多食飲釵鐶即隨出

治誤吞金銀及錢在腹內不下

孫用和方

石灰一杏核大硫黃一皂角子大用研為末酒調下
不計時候服

治誤吞髮

用木梳燒灰細研粥飲調下半錢匕不下再服

治誤吞梅李核

以溫水旋從小兒頭淋下却接其水與兒飲之

治誤吞銅鐵在咽喉內不下

用南燭根燒細研熟水調一盞服之

又方

用艾蒿一把剉以水五升煮取一升半服之即下

又方

取獾齒骨燒灰細研如粉每服以磨刀水調下一錢

治誤吞鏹若指強方

取臠毛半兩燒灰細研如粉以粥飲調半錢服之未
効再服

治誤吞鈎繩方

取常思草頭一把以水一大盞搗絞取汁分三四遍
飲之効

又方

若是桃枝竹釵哽但數數多食白糖即自消

治誤吞鈎方

以琥珀珠穿貫著鈎繩上推令前入至鈎所又復推以牽引出

療小兒桃李靨

用狗頭煮湯磨頭上瘡

治誤吞錢入腹

用羊脰骨燒成灰研為末每服二錢用溫水調下或米飲下薺芫取汁呷之自化

又方

出海上名方

用蛀栗子燒灰存性為末每服半錢米飲調下

治小兒誤吞銅錢等物不出

出聖惠方

煮葵菜多食之即下如神一方用冬葵子根煮汁飲之即出

治誤吞銅鐵物

出經驗良方

細研硬炭為末飯飲調下於大便瀉下如烏梅狀方用炭燒通紅急搗為末米飲調下亦治誤吞針釘等物連數服乃驗

又方

經驗良方

用葶薺不拘多少研爛水嚥喫即下非時收下乾為

末冷水調灌

治骨鯁方

楊氏寶書

用筒子極硬白炭礮為末濃米飲調下無効再喫神

驗

治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下

出肘後方

於臘月中取鰕魚膽懸北簷下令乾每有魚鯁取一

皂角子許以酒煎化溫服若得吐其骨即隨涎出若未吐更飲溫酒但以吐為度酒隨量飲之若不便出再煎一塊無有不出者若鯁在臟腑中日久黃瘦甚者服之亦得出於倉卒不得鰕魚或鱖魚鮪魚鯽魚俱可皆以臘月收之為佳

治小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出者

同前

煮白梅肉研爛後調象牙末厚傅骨刺處自軟一方無象牙末用沙糖含須臾自下

誤吞錢

出傳言
通用方

濃煎艾湯一二盞入錫頓服半斤

通氣散

出醫方
妙選

治誤吞銅錢鐵物及鈎繩之類在咽喉

不下

臧毛

一錢
燒灰

磁石

一皂角子
大燒灰

象牙末

一錢
燒存性

右件搗細末每服半錢新水調下

食治諸病

附論

夫生民之道莫不自小至大若無其小卒不成大故易

曰積小成高大也凡小兒之病狀證甚多造次之間偏載不盡其諸藥方備在諸經今聊舉食治單方以救倉卒之要爾

方

四味梁米湯 治小兒泄注

梁米 稻米 黍米

各三合

蠟

如半彈丸大

右以東流水二升煮梁米三沸絞去滓以汁煮稻米三沸去滓用汁煮黍米三沸絞去滓置蠟於汁中候

消每服半合空心午後各一隨兒大小加減

牡丹粥方 治小兒癖瘕病

牡丹葉

漏蘆

去蘆頭

決明

各一兩半

雄猪肝

去筋膜切碎二兩

右水三升煎牡丹葉等三味去滓取一升半入猪肝及純粳米二合煮如常粥空腹食之隨兒大小加減

人參粥方

出聖惠方

治小兒冷傷脾胃嘔逆及痢驚癇

人參

半兩去蘆頭

白茯苓

三分

粟米

半合

麥門冬

一兩去心

右細剉每服半兩以水一大盞煎諸藥至七分去滓

下米作粥食

鷄子餅 治小兒秋夏中暴冷忽下痢腹脹乍寒乍熱

渴甚食之

鷄子

二枚
去殼

胡粉

半兩炒
令黃

黃蠟

一兩
大

右先下蠟於銚內微火上鎔次下鷄子黃及胡粉調和候冷作餅與兒空心午後食之量大小加減

淡竹葉粥方

出聖
惠方

治小兒心臟風熱精神恍惚

淡竹葉

一握

粳米

一合

茵陳

半兩

右水二大盞煎二味取汁一盞去滓後投米作粥食之

郁李仁粥方

出聖惠方

治小兒水氣腹肚虛脹頭面浮腫小

便不利

郁李仁

一兩湯浸去皮尖微炒

桑根白皮

一兩剉

粟米

一合

右搗碎每服半兩以水一大盞煎至七分去滓下米作粥入少生薑汁任意食之

黍米粥方

出聖惠方

治小兒下痢日夜數十行漸至困弱

黍米

合一鷄子

枝一黃蠟

兩半

右煮粥臨熟下鷄子蠟攪令勻空腹服之

馬齒菜汁粥方

出聖惠方

治小兒血痢不差

馬齒菜汁

合一蜜

半

粟米

合一

右以水一大盞煮作粥後入二味和調食前服之

扁豆粥方

治小兒霍亂母食

扁豆莖

切焙一升

人參

二兩

右以水三升煮扁豆莖全熟下人參煎至二升去滓

取汁煮粟三合為粥與乳母食臨乳兒時先按去少許冷乳汁然後乳兒母常食此粥佳

牛乳飲 治小兒嘔吐

牛乳一合生薑汁半合

右於銀器中慢火同煎約至六七沸一歲兒飲半合仍量兒大小以意加減

牛蒡粥方出聖惠方 治小兒心臟積熱煩躁恍惚

牛蒡根汁一合粳米一合

右以水一大盞煮粥臨熟投牛蒡汁攪勻空腹溫溫服之

鷄子粥方

出聖惠方

治小兒下痢不止瘦弱

鷄子

一枝糯米一合

右煮粥臨熟破鷄子相和令食之

梨湯粥方

出聖惠方

治小兒心臟風熱昏憤躁悶不能下食

梨

三枚切

粳米

一合

右以水二升煮梨取汁一盞去滓投米煮粥食之

葛根粥方

出聖惠方

治小兒風熱嘔吐頭痛驚啼

葛根

剉一兩

粳米

一合

右以水二盞煎至一盞去滓下米作粥入生薑蜜各

少許食之

蘆根粥方

出聖惠方

治小兒嘔吐心煩熱渴

生蘆根

剉二兩

粟米

一合

右以水二大盞煎至一盞去滓投米作粥入生薑蜜

汁少許食之

漿水葱白粥方

出聖惠方

治小兒小便不通肚痛

粟米

二合葱白

三七莖去鬚細切

右以漿水煮作稀粥臨熟投葱白攪勻溫溫食之

治小兒驚風方

用白羊頭一箇丁香一兩同熬至軟同乳母空心盡

食之

猪子肝 治小兒久痢

用猪子肝一具切片炙熟空心食之

落床損瘀

附論

夫人血之在身隨氣而行常無停積凡小兒若因墮落傷損則血行失度隨傷損之處則停積若流入腹內亦積聚不散皆成瘀血在內顏色痿黃氣息微喘嗇嗇小寒翕翕微熱或時刺痛也

方

地黃散

出聖惠方

治小兒落床傷於肢節青瘀疼痛

生乾地黃 甜瓜子 蒲黃 桂心 赤芍藥

川大黃

劉微炒

當歸

劉微炒

桃仁

浸去皮尖雙仁炒黃各一分

右為細散每服不計時候用酒半合生地黄汁半合相和煖令酒勻調下半錢量兒大小加減服之

蒲黃湯

出聖惠方

治小兒落床墮地如有瘀血腹中陰陰寒

熱不肯乳哺但啼哭叫喚者

蒲黃 麥門冬 大黃 黃芩

各十銖

甘草 芒硝

八銖

七銖 黃連

十二銖

右㕮咀以水二升煮取一升去滓內芒硝分三服消息

視兒羸瘦半之大小便血即愈忌冷食

茯神散 治小兒落床體熱驚悸

茯神

半兩 龍膽

去蘆頭

犀角屑

子芩

麥門冬

去心焙

人參

去蘆頭

甘草

炙微赤剉已上各一分

右為麤散每服一錢以水一盞煎至五分去滓不拘時候量兒大小加減溫服

蒲黃湯

出醫方妙選

治打撲或落床墮地至損血氣羸瘦痿

黃或時刺痛遊走不定

蒲黃

當歸

洗焙

生地黄

各一兩

琥珀

赤芍藥

桂

心

各半兩

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服

大小加減服之又一方川大黃剉微炒

茯神丹

出醫方妙選

治證同前

茯神

當歸

麥門冬

去心各一兩

人參

黃芩

草

龍膽

桃仁

湯浸去皮炒各半兩

右為細末拌勻煉蜜和如黍米大每服十粒生地黄

汁少許同酒下大小加減

犀角散 治小兒落床體熱疼痛

犀角屑

赤芍藥

芎藭

當歸

剉微炒

甘草

炙微剉

已上各一分

川大黃

半兩剉微炒

右為麤散每服以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大小加減服之

治顛撲傷損

出楊氏寶書

用蘿蔔切細片研碎以罨之用紗帛裹患處過宿臭

甚即愈如覺骨損絞生藕汁和酒飲之即効一方用

蘿蔔子湯

又方

出楊氏
寶書

用半兩錢不拘多少煨通紅醋淬令酥脆研令細麝

香酒調下如顛撲折損立見接續微響其効如神

接骨丹

出微生
家寶

治小兒顛撲傷折筋骨通神

大礬

六箇

臘月猪脂

去膜淨熬
過四兩

黃蠟

熬淨
秤

蜜陀僧

別
研

秤

自然銅

如荔枝皮
者細研秤

黃丹

細研秤四
兩

血竭

別
研

沒


藥

別研
秤

滴乳香

別研細秤
各半兩

右研各製精細先將猪脂再熬成汁次下蠟攪勻次下蜜陀僧及大礬等六味皆逐旋下只留乳香末下用微火不得住手攪火纔猛即藥無力矣將欲成膏取下一茶少頃候藥不至大熱投乳香攪勻衆手乘溫熱急丸如彈子大以新磁罐子收之須厚蓋扎之每一大丸治兩人大人可治一人或作小丸乳香酒下空心服但不可多喫恐生骨耳



普濟方卷四百一